

Angiossarcoma Cutâneo: Metastização Rara *Cutaneous Angiosarcoma: Rare Metastasis*

Diana Martins Oliveira¹, Sara Pinheiro², Patrícia Dias¹

Palavras-chave: Hemangiossarcoma; Metástase Neoplásica; Neoplasias de Língua; Neoplasias da Pele.

Keywords: Hemangiosarcoma; Neoplasm Metastasis; Skin Neoplasms; Tongue Neoplasms.

Doente do género feminino de 90 anos, internada por agudização de dispneia no contexto de metastização pulmonar a partir de angiossarcoma cutâneo primário da perna esquerda, diagnosticado 2 anos antes. Durante o internamento desenvolveu múltiplas lesões nodulares pétéreas, friáveis e dolorosas na língua que aumentaram em número e tamanho atingindo posteriormente o palato duro - localizações secundárias do angiossarcoma (Fig. 1). O angiossarcoma cutâneo primário é um tumor vascular maligno raro, mais frequente em indivíduos idosos, leucodérmicos.^{1,2} Estes tumores geralmente metastizam para os pulmões, outras áreas da pele ou tecido subcutâneo, osso, fígado, cérebro e ovário. A sua metastização para a cavidade oral é extremamente rara compreendendo 0,1% de todas as neoplasias malignas orais.³ ■

Protecção de Seres Humanos e Animais: Os autores declaram que não foram realizadas experiências em seres humanos ou animais.

Direito à Privacidade e Consentimento Informado: Os autores declaram que nenhum dado que permita a identificação do doente aparece neste artigo.

Conflitos de Interesse: Os autores declaram a inexistência de conflitos de interesse na realização do presente trabalho.

Fontes de Financiamento: Não existiram fontes externas de financiamento para a realização deste artigo.

Correspondência: Diana Martins Oliveira
difilipa_oliveira@hotmail.com
Serviço de Medicina Interna A - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
Praceta Prof. Mota Pinto, 3000-075 Coimbra

Recebido: 16/09/2016

Aceite: 18/01/2017



Figura 1: Múltiplas formações nodulares pétéreas e friáveis correspondentes a localizações secundárias de angiossarcoma cutâneo.

REFERÊNCIAS

1. Wollina U, Hansel G, Schonlebe J, Averbek M, Paasch U, Uhl J, et al. Cutaneous angiosarcoma is a rare aggressive malignant vascular tumour of the skin. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2011;25:964-8.
2. Ambujam S, Audhya M, Reddy A, Roy S. Cutaneous angiosarcoma of the head, neck, and face of the elderly in type 5 skin. *J Cutan Aesthet Surg.* 2013; 6: 45-7.
3. Fanburg-Smith JC, Furlong MA, Childers EL. Oral and salivary angiosarcoma: a clinicopathologic study of 29 cases. *Mod Pathol.* 2003;16:263-71.

¹Serviço de Medicina Interna A - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal;

²Serviço de Oncologia Médica - Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E., Coimbra, Portugal